

SGLT2 阻害薬		回 /日	正常(mg/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
(商品名)	(eGFR)		60	45	30	25	20	15
エンパグリフロジン	ジャディアンス	1	10 - 25 (2型糖尿病)	慎重	慎重	投与しない		
			10 (慢性心不全)			慎重	試験なし	
ダパグリフロジン	フォシーガ	1	5 - 10 (1型・2型糖尿病)	慎重	慎重	投与しない		
			10 (慢性心不全)			試験なし		
			10 (慢性腎臓病)			慎重	試験なし	
カナグリフロジン	カナグル	1	100	慎重	慎重	投与しない		
トホグリフロジン	デベルザ	1	20	慎重	慎重	投与しない		
イプラグリフロジン	スーグラ	1	50 - 100 (1型・2型糖尿病)	慎重	慎重	投与しない		
ルセオグリフロジン	ルセフィ	1	2.5 - 5	慎重	慎重	投与しない		
DPP4 阻害薬		回 /日	正常(mg/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
(商品名)	(eGFR)		60	50	45	30	15	
シタグリプチン	ジャヌビア グラクティブ	1	50 - 100		25 - 50	12.5 - 25		
リナグリプチン	トラゼンタ	1	5	容量調節なし				
テネリグリプチン	テネリア	1	20 - 40	容量調節なし				
アログリプチン	ネシーナ	1	25		12.5	6.25		
ビルダグリプチン	エクア	1-2	50 - 100		50 (1日1回)			
アナグリプチン	スイニー	2	200 - 400			100 (1日1回)		
サキサグリプチン	オングリザ	1	2.5 - 5		2.5			
トレラグリプチン	ザファテック	週1	100 (週1回)		50 (週1回)	25 (週1回)		
オマリグリプチン	マリゼブ	週1	25 (週1回)			12.5 (週1回)		
ビグアナイド薬		回 /日	正常(mg/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
(商品名)	(eGFR)		60	45	30	15		
メトホルミン	メトグルコ	2-3	500-2250	Max1500	Max750	禁忌		
経口GLP-1		回 /日	正常(/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
(商品名)	(eGFR)		60	45	30	15		
セマグルチド	リベルサス	1	3, 7, 14 mg					
チアゾリジン薬		回 /日	正常(mg/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
(商品名)	(eGFR)		60	50	45	30	15	
ピオグリタゾン	アクトス	1	15-45	慎重				禁忌
イメグリミン		回 /日	正常(mg/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
(商品名)	(eGFR)		60	50	45	30	15	
イメグリミン	ツイミーグ	2	2000		1000 /日		500 /日	推奨せず
SU薬		回 /日	正常(mg/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
(商品名)	(eGFR)		60	45	30	15		
グリメピリド	アマリール	1-2	0.5 - 2 (著者変更)	慎重		禁忌		
グリクラジド	グリミクロン	1-2	20 - 80 (著者変更)	慎重		禁忌		

配合薬	(商品名)	回 /日	正常(mg/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析	
			(eGFR)	60	45	30	15		
SGLT2 + DPP4阻害薬	トラディアンズ AP	1	: トラゼンタ 5 + ジャディアンス 10				投与しない		
	BP	1	: トラゼンタ 5 + ジャディアンス 25				投与しない		
	カナリア	1	: カナグル 100 + テネリア 20				投与しない		
	スージャヌ	1	: スーグラ 50 + ジャヌビア 50				投与しない		
メトホルミン + DPP4阻害薬	エクメット LD	2	1錠: エクア 50 + メトホルミン 250				禁忌		
	エクメット HD	2	1錠: エクア 50 + メトホルミン 500				禁忌		
	メトアナLD	2	1錠: スイニー 100 + メトホルミン 250				禁忌		
	メトアナLD	2	1錠: スイニー 100 + メトホルミン 500				禁忌		
	イニシンク	1	1錠: ネシーナ 25 + メトホルミン 500				禁忌		
メトホルミン + ピオグリタゾン	メタクト LD	1	: メトホルミン 500 + アクトス 15					禁忌	
	HD	1	: メトホルミン 500 + アクトス 30					禁忌	
DPP4阻害薬 + ピオグリタゾン	リオベル LD	1	: ネシーナ 25 + アクトス 15					禁忌	
	HD	1	: ネシーナ 25 + アクトス 30					禁忌	
グリニド + αGI	グルベス	3	1錠: グルファスト 10 + ベイスン 0.3						
グリニド薬		回 /日	正常(mg/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析	
			(eGFR)	60	45	30	15		
ナテグリニド	ファスティック	3	1回 90 - 120		慎重		慎重	禁忌	
ミチグリニド	グルファスト	3	1回 10		慎重 (1回 2.5 - 10)				
レパグリニド	シュアポスト (販売中止)	3	1回 0.25 - 1						慎重
α-GI		回 /日	正常(mg/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析	
			(eGFR)	60	45	30	15		
ボグリボース	ベイスン	3	1回 0.2 - 0.3						慎重
ミグリトール	セイブル	3	1回 50 - 75						慎重
アカルボース	グルコバイ (販売中止)	3	1回 50 - 100						慎重

注射GLP-1	(商品名)	回 /日	正常(/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
			(eGFR)	60	45	30	15	
リラグルチド	ビクトーザ	1	0.3 - 1.8 mg					
セマグルチド	オゼンピック	週1	週1回 0.25 - 1					
	ウゴービ		週1回 0.25 - 2.4					
デュラグルチド	トルリシティ	週1	週1回 0.75 - 1.5					
GIP/GLP-1		回 /日	正常(/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
			(eGFR)	60	45	30	15	
チルゼパチド	マンジャロ	週1	週1回 2.5 - 15					
インスリン		回 /日	正常(/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
			(eGFR)	60	45	30	15	
※腎機能低下に伴い、インスリン適宜減量								
配合注		回 /日	正常(/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
			(eGFR)	60	45	30	15	
GLP-1 + 基礎インスリン	ゾルトファイ	1						
	ソリクア	1			慎重			